

Índice Tobillo-Brazo

Interpretación

ITB	
>1,3	Sospecha de calcificación arterial
0,91 a 1,3	Normal
0,71 a 0,9	Enfermedad arterial periférica obstructiva leve
0,41 a 0,7	Enfermedad arterial periférica obstructiva moderada
≤0,4	Enfermedad arterial periférica obstructiva grave

Otros autores dan valores un poco diferentes para los distintos niveles, pero es prácticamente unánime considerar normal por encima de **0,9** y por debajo de **0,5** suficientemente grave para requerir una evaluación por cirugía vascular.

ITB - Filtrado glomerular

L. Herranz de la Morena. **Índice tobillo brazo para la evaluación de la enfermedad arterial periférica.** Av Diabetol 2005; 21: 224-226.

<https://aeevh.org/wp-content/uploads/2020/05/00011455archivoarticulo.pdf>

Arévalo Manso, Juan José; Juárez Martín, Belén; Chacón, Encarnación Gala; Carmen, Rodríguez Martínez. **El índice tobillo-brazo como predictor de mortalidad vascular.** Gerokomos vol.23 no.2 Madrid jun. 2012.

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1134-928X2012000200007

Guía de Buena Práctica Clínica en Dolor neuropático en el paciente diabético

https://www.cgcom.es/sites/default/files/gbpc_dolor_neuropatico.pdf